

SITUACIÓN DEL TIFUS EXANTEMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

El Tifus Exantemático es una enfermedad producida por un microbio denominado *Rickettsia prowazeki*, que es transmitido a través de piojos. Su presencia es de carácter endémico en muchas zonas del departamento y está asociado a la sobrepoblación estacional de piojos, a condiciones de hacinamiento y fundamentalmente a la falta de higiene personal, del vestido y de la ropa de cama (condiciones propicias para la sobrepoblación del mencionado insecto).


En 1997 se presentaron 136 casos de Tifus exantemático; en 1998, 165 (entre sospechosos y confirmados), de los cuales 37 se llegaron a confirmar. No se produjeron defunciones en 1998. La población afectada residía en las localidades del Distrito de Ccatca y Distrito de Ocangate de la Provincia de Quispicanchi, población eminentemente rural, que vive por encima de los 3500 ó 4000 m.s.n.m., donde las condiciones de saneamiento ambiental aún son deficientes.

Frente a este problema se realizaron las siguientes actividades:

- ❑ Búsqueda Activa de Febriles Exantemáticos (personas de fiebre y manchas roja en la piel), quienes eran considerados casos sospechosos de Tifus Exantemático.
- ❑ Implementación de la vigilancia epidemiológica comunal con participación de los Promotores de Salud para la captación temprana de casos.
- ❑ Detección temprana de casos, diagnóstico precoz a nivel local, y tratamiento oportuno y gratuito de casos.
- ❑ Educación Sanitaria y Sensibilización a la población para la toma de medidas preventivas, como son el aseo personal, limpieza de la vivienda y de la ropa de cama eliminación mecánica de los piojos, entre otros.
- ❑ Conformación de Comités Multisectoriales de Lucha contra el Tifus Exantemático a nivel distrital y comunal.
- ❑ Fumigación con insecticidas piretroides de última generación (inocuos para la salud personal) del vestido y ropa de cama del 100% de los pobladores que viven en zonas de riesgo de Tifus Exantemático.
- ❑ Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica para la detección temprana de cualquier brote posterior y capacidad de implementar rápidamente las medidas de control correspondiente.

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, se han presentado 3 casos confirmados en las Semanas Epidemiológicas 33 y 34 en las localidades de Ullpo, Llachi y Ausaray del ámbito del Distrito de Ccatca, los que se detectaron tempranamente a través de la vigilancia epidemiológica comunal. Al realizarse las acciones de control correspondiente la situación llegó a controlarse, no habiéndose presentado ningún caso confirmado de Tifus Exantemático en las últimas Semanas Epidemiológicas.

**Casos de Tifus Exantemático por Semanas Epidemiológicas
Cusco 1998 Semana. 37**



Fuente: Dirección de Salud Cusco