

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS)

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA DEL TRABAJO




Figura 1. Diagnóstico a trabajadores en el Servicio de Psicología. DEMPT / CENSOPAS; I trimestre y II trimestre de 2009

Durante el primer semestre del año 2009 se atendieron 288 trabajadores en el servicio de Psicología del CENSOPAS del INS, tres de ellas fueron de sexo femenino. Si tenemos en cuenta el diagnóstico, se puede apreciar que la mayoría no tuvo ninguna alteración mental, sólo 6,2% presentó algún tipo de alteración en su salud mental como: depresión 3,1% (12 trabajadores), estrés 2,1% (8 trabajadores), ansiedad 1% (4 trabajadores). Asimismo, cuatro trabajadores se presentaron a la cita pero no fueron evaluados (1,0%). En la Figura 1 se muestra la distribución de los pacientes que presentaron

alguna alteración según su diagnóstico; en el primer trimestre (enero-marzo) se atendió a 214 personas de sexo masculino y una de sexo femenino, de los cuales 8,4% presentó alguna alteración en su salud mental, de ellos 4,7% fueron diagnosticados con depresión (10 trabajadores), 2,8% con estrés (6 trabajadores), 0,9% con ansiedad (2 trabajadores); por otro lado, en el segundo trimestre (abril-junio) se atendieron 173 personas dentro de los cuales se atendió a dos personas de sexo femenino, el 3,6% presentó alguna alteración en su salud mental.




Figura 2. Trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología según la actividad de la empresa. DEMYPT/CENSOPAS; I trimestre y II trimestre de 2009




Figura 3. Residencia habitual de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS; I trimestre y II trimestre de 2009.

Del total de trabajadores atendidos durante los trimestres I y II (enero – junio), la mayor proporción corresponde a obreros que provienen de empresas mineras (45,1%), seguido de las empresas tipo contrata (25,8%). Durante el primer trimestre, se atendió en mayor proporción a trabajadores que provienen de empresas metalúrgicas (39,1%), seguido de las empresas mineras (34,4%); mientras que en el II trimestre, del total de atenciones, dos correspondían al sexo femenino, y en su mayoría provienen de empresas mineras (58,4%), seguido por trabajadores que provienen de empresas tipo contrata (28,3%), el 7,5% de empresas industria.

En el primer semestre del 2009 la mayor proporción de personas atendidas provienen del departamento de Lima (28,6%) seguido del departamento de Junín (23,5%). La Figura 3 muestra que en el trimestre la mayor proporción de pacientes atendidos provienen del departamento de Ancash (38,1%) seguidos por Lima (22,8%), Junín (18,1 %) y 20,9% en conjunto, provienen de otros departamentos; mientras que en el segundo trimestre, el 35,8% provienen del departamento de Lima, 30,1% de Junín; 6,9% de Pasco, y el 27,2% en conjunto provienen de otros departamentos.




Figura 4. Grado de instrucción de los trabajadores atendidos en el Servicio de Psicología. DEMYPT/CENSOPAS; I y II trimestre de 2009

Durante el primer semestre, la mayor proporción de los pacientes atendidos en el Servicio de Psicología del CENSOPAS tenían secundaria completa (35,6%) y en menor proporción, aquellos sin instrucción (0,8%).

En el primer trimestre (enero-marzo) se atendió 36,3% de trabajadores con secundaria completa y 0,5% sin instrucción; comparativamente, en el segundo trimestre (abril-junio) la mayor proporción tuvieron secundaria completa (34,7%), y en menor proporción fueron trabajadores sin instrucción (1,2%). Por otro lado, se observa que del total de trabajadores atendidos en el periodo enero-junio, solo hubo una persona que corresponde al área administrativa. Si tenemos en cuenta la situación laboral, durante el primer semestre, 72,7% se encontraban en situación postocupacional y el 27,3% se encontraba laborando en alguna entidad.

Evaluaciones psicológicas

En el mes de mayo, se realizaron evaluaciones psicológicas a los pobladores de las




Figura 5. Número de evaluados según sexo.

Fuente: Estudio epidemiológico – Línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Constancia. Cusco 2009

comunidades de Chilloroya, Uchucarco, Añahuiche, Chamaca y Livitaca, de la región Cusco, en dicha intervención se atendieron 395 personas, entre niños (106) y adultos (289).

A la fecha, se han procesado las atenciones a los menores de 12 años de edad, a quienes se les evaluó desarrollo psicomotor (niños de 2 a 3 años), y coeficiente intelectual, encontrándose que 5% presenta riesgo y el 3,3% posee retraso en su desarrollo psicomotor; 1,3% es fronterizo y 18,2% se ubica en el nivel promedio bajo, en cuanto a su coeficiente intelectual.

Se atendieron 289 adultos, de ambos sexos, se halló que 6,3% son analfabetos y sólo 1% poseen educación superior; en lo referente a actividad laboral, las poblaciones se caracterizan por la ganadería, agricultura y el trabajo en minería artesanal. Se evaluó ansiedad, depresión, violencia familiar, consumo de alcohol y coordinación visual motora, debido a que esta población se ubica cerca de la zona de influencia de un proyecto minero.




Figura 6. Número de pobladores evaluados según lugar de residencia.

Fuente: Estudio epidemiológico – Línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Constancia. Cusco 2009

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	8776	23,3	8777	22,0	10018	22,4	22,6
Ancash	24344	30,6	25108	29,4	23493	30,1	30,0
Apurímac I	11012	34,6	11291	33,4	11938	33,0	33,7
Apurímac II	8555	34,1	8259	34,5	8841	35,1	34,6
Arequipa	15936	9,0	16135	9,2	18983	7,9	8,7
Ayacucho	10160	26,0	9457	25,7	7801	28,4	26,7
Cajamarca I	13351	32,0	13682	32,0	14889	31,3	31,8
Cajamarca II	8606	30,5	9228	30,0	10817	29,9	30,1
Cajamarca III	5698	34,1	5789	31,7	5008	29,5	31,7
Callao	3299	7,7	3152	6,7	3057	6,0	6,8
Cusco	12801	22,8	12099	22,6	13102	22,6	22,6
Huancavelica	2442	32,3	4240	32,6	4806	32,4	32,4
Huánuco	9985	30,0	8950	29,3	8566	29,5	29,6
Ica	8885	8,6	7769	9,1	7042	9,4	9,0
Jaén	7389	22,6	7502	23,7	8746	23,4	23,2
Junín	16579	21,6	15738	20,8	18738	20,5	21,0
La Libertad	12606	15,5	13281	20,2	13127	17,3	17,7
Lambayeque	11962	15,6	10507	15,7	12152	16,6	16,0
Lima Ciudad	10170	4,2	8195	4,9	6626	4,0	4,4
Lima Este	13779	5,7	13873	5,5	14698	5,4	5,5
Lima Norte	7468	9,7	5383	10,2	6936	9,9	9,9
Lima Sur	10915	5,7	10137	6,1	11671	5,8	5,9
Loreto	11328	23,8	12168	22,7	5445	22,0	22,8
Madre De Dios	2459	9,7	3009	11,4	2597	10,1	10,4
Moquegua	797	11,8	769	8,6	454	12,6	11,0
Pasco	5450	20,5	5299	19,2	4497	18,9	19,6
Piura I	4102	23,3	4477	24,0	2321	29,3	25,6
Piura II	8030	18,3	7164	20,9	3922	19,2	19,5
Puno	7148	18,1	5706	18,0	4226	19,6	18,5
San Martín	12448	14,7	13342	14,9	14256	14,2	14,6
Tacna	4563	4,7	4345	4,3	2669	5,4	4,8
Tumbes	3779	10,0	3550	10,0	3806	10,0	10,0
Ucayali	7977	17,4	5426	21,0	3969	23,7	20,7

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Apurímac-II, Apurímac-I, Huancavelica, Cajamarca-I, Cajamarca-III, Cajamarca-II y Ancash, las cuales superan en promedio el 30%

de desnutrición crónica en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Lima Norte, Ica, Arequipa, Callao, Lima Sur, Lima Este, Tacna y Lima Ciudad presentan, en promedio, menos de 10% de desnutrición crónica en el trimestre.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	8735	2,7	8750	2,3	10020	2,4	2,4
Ancash	24196	1,3	24945	1,3	23327	1,2	1,2
Apurímac I	10985	1,6	11251	1,2	11903	1,2	1,3
Apurímac II	8558	1,0	8246	0,9	8832	0,8	0,9
Arequipa	15914	1,6	16089	1,5	18927	1,4	1,5
Ayacucho	10114	1,5	9408	1,8	7776	1,9	1,7
Cajamarca I	13290	1,2	13651	1,4	14820	1,4	1,4
Cajamarca II	8571	0,8	9205	0,8	10742	1,1	0,9
Cajamarca III	5703	2,1	5786	1,7	5021	1,2	1,7
Callao	3294	1,9	3165	2,6	3068	2,2	2,2
Cusco	12712	1,7	11987	1,7	13025	1,6	1,7
Huancavelica	2436	2,3	4197	1,9	4744	2,0	2,0
Huánuco	9942	1,7	8906	1,4	8512	1,2	1,5
Ica	8868	1,9	7775	1,6	7038	1,7	1,7
Jaén	7409	2,4	7486	2,1	8700	2,2	2,2
Junín	16507	2,0	15673	1,8	18632	1,7	1,8
La Libertad	12542	1,7	13217	1,8	13091	2,0	1,8
Lambayeque	11943	1,9	10486	2,4	12119	2,3	2,2
Lima Ciudad	10194	1,7	8214	1,8	6624	1,4	1,6
Lima Este	13840	1,8	13929	1,6	14782	1,8	1,7
Lima Norte	7484	1,8	5371	2,2	6903	2,1	2,0
Lima Sur	10897	1,1	10124	1,2	11668	1,3	1,2
Loreto	11295	3,7	12066	3,7	5394	2,5	3,3
Madre De Dios	2462	2,6	3010	2,3	2606	2,3	2,4
Moquegua	799	0,6	766	0,7	455	0,0	0,4
Pasco	5424	3,2	5270	3,6	4481	3,2	3,3
Piura I	4087	2,3	4476	2,3	2314	1,8	2,1
Piura II	8011	2,7	7134	2,9	3915	3,3	3,0
Puno	7140	1,2	5706	1,4	4214	1,5	1,4
San Martín	12454	2,4	13320	2,9	14215	2,1	2,5
Tacna	4563	0,7	4341	0,8	2667	0,8	0,8
Tumbes	3781	2,7	3544	2,7	3797	2,2	2,5
Ucayali	7965	3,2	5362	2,8	3950	2,4	2,8

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan el mayor índice de desnutrición aguda son Pasco, Loreto y Piura-II, las cuales superan en promedio el 3% de desnutrición aguda en el

trimestre, mientras que las direcciones de salud Apurímac-II, Cajamarca-II, Tacna y Moquegua presentan, en promedio, menos de 1% de desnutrición aguda en el trimestre.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	8903	10,5	8913	9,9	10176	10,3	10,2
Ancash	24524	12,0	25257	10,8	23682	10,9	11,2
Apurímac I	11097	18,5	11364	16,2	12317	16,0	16,9
Apurímac II	8575	14,4	8271	13,5	8855	13,9	13,9
Arequipa	16072	4,9	16224	5,2	19084	4,5	4,9
Ayacucho	10205	11,3	9529	11,1	7966	12,7	11,7
Cajamarca I	13580	12,4	13865	12,3	15077	12,2	12,3
Cajamarca II	8887	11,6	9530	10,5	10944	11,2	11,1
Cajamarca III	5781	13,0	5844	12,4	5072	11,2	12,2
Callao	3349	3,8	3229	4,4	3120	3,7	4,0
Cusco	13077	11,5	12374	10,5	13202	11,6	11,2
Huancavelica	2480	12,4	4301	12,6	4867	12,3	12,4
Huánuco	10088	12,3	9028	11,2	8630	10,8	11,4
Ica	8994	5,1	7885	4,8	7125	5,5	5,1
Jaén	7596	11,7	7750	11,2	8932	10,8	11,2
Junín	16768	10,4	15899	9,9	18909	8,9	9,8
La Libertad	12750	6,8	13565	8,2	13305	7,6	7,5
Lambayeque	12133	6,5	10644	7,3	12342	7,2	7,0
Lima Ciudad	10377	3,3	8352	3,6	6746	2,9	3,2
Lima Este	14070	4,0	14144	4,1	14978	4,3	4,1
Lima Norte	7558	4,8	5469	5,7	7070	4,9	5,1
Lima Sur	11073	3,4	10250	3,9	11793	3,6	3,7
Loreto	11499	15,9	12317	15,4	5507	13,9	15,1
Madre De Dios	2562	5,5	3141	6,5	2712	6,3	6,1
Moquegua	812	4,3	788	2,8	457	3,5	3,5
Pasco	5522	11,9	5377	11,1	4544	11,0	11,3
Piura I	4173	10,0	4562	11,9	2360	13,3	11,7
Piura II	8166	9,3	7267	11,0	3980	12,1	10,8
Puno	7248	6,5	5766	6,3	4280	7,4	6,7
San Martín	12594	9,6	13493	10,4	14373	9,4	9,8
Tacna	4575	1,6	4348	1,9	2667	2,5	2,0
Tumbes	3847	5,5	3596	6,5	3851	6,3	6,1
Ucayali	8063	9,9	5506	11,2	4048	12,1	11,0

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS, Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurímac I y Loreto, las cuales superan en promedio el 15% de desnutrición global

en el trimestre, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta en promedio menos del 3% de desnutrición global en el trimestre.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud, Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	2564	24,4	2306	23,7	2782	24,2	24,1
Ancash	4704	13,8	4639	14,1	4429	14,0	14,0
Apurímac I	1381	14,1	1296	15,1	1389	13,6	14,3
Apurímac II	1317	12,3	1279	11,4	1345	11,7	11,8
Arequipa	4245	11,0	3780	10,9	4431	11,6	11,2
Ayacucho	2889	15,6	2457	15,5	1740	16,3	15,8
Cajamarca I	4166	11,1	3658	11,8	3874	10,8	11,2
Cajamarca II	1782	11,8	1868	11,9	2010	11,4	11,7
Cajamarca III	762	18,5	700	17,6	639	16,1	17,4
Callao	1240	12,8	1089	12,5	800	13,3	12,9
Cusco	2875	11,8	2854	12,0	2458	12,6	12,1
Huancavelica	761	14,2	1081	14,4	1292	14,3	14,3
Huánuco	2798	15,5	2420	15,5	2317	15,7	15,6
Ica	2359	13,4	2134	12,8	2015	12,6	12,9
Jaén	1640	21,9	1703	21,6	1924	19,7	21,0
Junín	5370	19,6	5201	18,4	5493	17,7	18,6
La Libertad	3994	13,1	4369	13,8	4378	12,9	13,3
Lambayeque	2977	13,7	2724	15,3	2674	15,3	14,8
Lima Ciudad	2259	16,1	1992	18,0	1486	17,3	17,1
Lima Este	3274	15,0	3014	15,9	3116	16,5	15,8
Lima Norte	1505	13,8	1142	14,4	1192	16,1	14,8
Lima Sur	2826	14,0	2842	15,8	3008	16,0	15,3
Loreto	2687	26,2	2985	22,6	1188	19,4	22,8
Madre De Dios	506	8,3	584	10,8	605	11,1	10,1
Moquegua	111	7,2	88	11,4	88	15,9	11,5
Pasco	1193	18,4	1132	19,1	880	18,1	18,5
Piura I	1155	16,5	1191	16,5	802	19,1	17,4
Piura II	3011	17,4	2870	18,9	1580	18,5	18,2
Puno	1666	11,9	1407	10,4	945	11,6	11,3
San Martín	3579	22,1	3294	24,0	3516	22,4	22,9
Tacna	1241	7,4	1122	7,6	755	7,7	7,6
Tumbes	985	12,7	904	13,3	1077	13,9	13,3
Ucayali	510	15,7	39	15,4	261	17,6	16,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS, Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática,

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Amazonas, San Martín, Loreto y Jaén, las cuales superan en promedio el 20% de déficit

de peso en gestantes en el trimestre, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta en promedio, menos del 10% de déficit de peso en gestantes en el trimestre.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	2564	18,2	2306	20,4	2782	17,6	18,7
Ancash	4704	28,0	4639	28,2	4429	27,3	27,9
Apurímac I	1381	23,8	1296	23,7	1389	24,8	24,1
Apurímac II	1317	24,4	1279	24,2	1345	23,5	24,0
Arequipa	4245	36,3	3780	34,5	4431	34,7	35,2
Ayacucho	2889	24,5	2457	25,2	1740	22,8	24,2
Cajamarca I	4166	30,4	3658	28,8	3874	29,8	29,7
Cajamarca II	1782	20,9	1868	21,5	2010	24,7	22,4
Cajamarca III	762	16,4	700	18,4	639	22,8	19,2
Callao	1240	39,8	1089	37,8	800	37,0	38,2
Cusco	2875	31,3	2854	31,8	2458	31,2	31,4
Huancavelica	761	20,5	1081	24,5	1292	23,1	22,7
Huánuco	2798	22,2	2420	22,0	2317	24,5	22,9
Ica	2359	39,2	2134	41,8	2015	38,4	39,8
Jaén	1640	19,7	1703	18,1	1924	19,9	19,2
Junín	5370	21,9	5201	22,6	5493	23,9	22,8
La Libertad	3994	34,1	4369	31,8	4378	29,7	31,9
Lambayeque	2977	33,6	2724	32,4	2674	31,4	32,4
Lima Ciudad	2259	33,3	1992	30,1	1486	29,1	30,8
Lima Este	3274	30,4	3014	31,1	3116	29,8	30,4
Lima Norte	1505	40,5	1142	33,5	1192	36,4	36,8
Lima Sur	2826	32,6	2842	33,6	3008	29,9	32,0
Loreto	2687	20,0	2985	22,3	1188	23,1	21,8
Madre De Dios	506	42,3	584	39,9	605	41,8	41,3
Moquegua	111	36,0	88	40,9	88	29,5	35,5
Pasco	1193	22,0	1132	23,5	880	22,7	22,7
Piura I	1155	26,1	1191	27,6	802	21,7	25,2
Piura II	3011	31,3	2870	28,7	1580	29,6	29,9
Puno	1666	30,9	1407	31,4	945	25,7	29,3
San Martín	3579	20,5	3294	19,2	3516	20,7	20,1
Tacna	1241	45,6	1122	46,0	755	47,7	46,4
Tumbes	985	39,0	904	38,8	1077	39,5	39,1
Ucayali	510	29,4	39	30,8	261	21,1	27,1

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS, Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna, Madre de Dios, Ica, Tumbes, Callao, Lima Norte, Moquegua y Arequipa, las cuales superan en promedio el 35% de sobrepeso

en gestantes en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Jaén, Cajamarca-III y Amazonas presentan en promedio menos del 20% de sobrepeso en gestantes, en el trimestre.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2009

DISA	Enero		Febrero		Marzo		Promedio Trimestral
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Amazonas	501	17,2	377	18,8	544	19,1	18,4
Ancash	1893	35,0	1520	31,3	1569	32,8	33,0
Apurímac I	569	38,3	582	38,3	586	35,7	37,4
Apurímac II	326	53,1	354	51,4	427	51,8	52,1
Arequipa	2075	17,7	1337	20,4	1656	20,0	19,4
Ayacucho	1508	36,8	1328	34,3	1116	37,0	36,0
Cajamarca I	1440	15,5	1142	17,5	1234	14,7	15,9
Cajamarca II	286	16,8	398	15,3	356	18,8	17,0
Cajamarca III	228	14,9	189	12,7	250	10,4	12,7
Callao	702	32,2	590	35,9	434	36,4	34,8
Cusco	1620	33,0	1574	29,8	1452	32,7	31,8
Huancavelica	299	44,8	363	53,4	542	42,6	47,0
Huánuco	1541	22,3	1180	25,2	1109	25,2	24,2
Ica	774	16,9	737	20,6	640	20,2	19,2
Jaén	509	18,9	492	20,3	597	21,8	20,3
Junín	1847	29,8	1693	26,9	1800	26,9	27,9
La Libertad	2360	22,8	2133	20,7	1966	23,4	22,3
Lambayeque	1621	14,4	1474	14,0	1566	15,3	14,5
Lima Ciudad	1064	23,7	750	36,3	601	31,4	30,5
Lima Este	1174	25,0	1064	25,5	1180	29,2	26,6
Lima Norte	445	20,7	369	25,7	441	29,5	25,3
Lima Sur	1978	20,8	2006	24,0	1869	22,3	22,4
Loreto	1260	30,9	1344	32,9	738	32,8	32,2
Madre De Dios	83	25,3	142	14,1	145	17,9	19,1
Moquegua	25	0,0	36	8,3	26	30,8	13,0
Pasco	723	36,1	550	35,8	411	33,8	35,2
Piura I	202	19,8	280	21,4	109	14,7	18,6
Piura II	811	18,4	716	25,3	333	17,1	20,3
Puno	757	47,6	599	53,8	338	54,1	51,8
San Martín	1896	16,1	1514	15,5	1731	11,7	14,4
Tacna	229	21,0	182	30,2	126	32,5	27,9
Tumbes	399	20,3	342	16,4	407	18,2	18,3
Ucayali	45	13,3	0		100	5,0	9,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS.
Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática,

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Apurímac-II, Puno y Huancavelica, las cuales superan en promedio el 40% de anemia en gestantes en el trimestre,

mientras que las direcciones de salud Lambayeque, San Martín, Moquegua, Cajamarca-III y Ucayali, presenta en promedio, menos del 15% de anemia en gestantes, en el trimestre.

OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS (OGIS)




Figura 1. Visitas realizadas a la página principal del portal web; I y II trimestre de 2009

Durante el primer semestre, el portal Web ha sido visitado 202 750 veces, el cual incluye los accesos de tránsito para ingresar a otras páginas dentro de la misma Web. Del total de visitas realizadas a las diferentes páginas principales; la página Ensayos Clínicos ha sido visitada con mayor frecuencia (15,4%), seguida por la página Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (7,8%), la página Investigaciones Observacionales (7,4%),

Acerca del CENAN (7,2%), página de NETLAB (7,2%) y otros 52,7%.

Durante el primer semestre, los artículos más revisados de la Revista Peruana de Medicina se encuentran en la sección Artículos Originales (41,6%), seguido de las Comunicaciones Cortas (15,2%), Artículo de Revisión (9,2%), Simposio (6,0%), Carta al Editor (5,8%), Editorial (4,9%) y otras secciones (17,3%).




Figura 2. Accesos a cada sección de la *Revista Peruana de Medicina Experimental* del portal web del INS; I y II trimestre de 2009